原 著

DRV/RTV から DRV/COBI へのブースター変更症例における臨床所見の変化

安達 英輔¹⁾, 佐藤 秀憲¹⁾, 菊地 正¹⁾, 古賀 道子¹⁾,
堤 武也¹⁾, 鯉淵 智彦¹⁾, 四柳 宏¹⁾

¹⁾ 東京大学医科学研究所附属病院感染免疫内科

背景: 2017年1月から本邦でダルナビル/コビスタット (DRV/COBI) が使用可能となり, ダルナビル/リトナビル (DRV/RTV) からブースターのみを入れ替えるレジメン変更が初めて可能となった。COBIはRTVと同様に脂質代謝や腎機能への影響があると考えられるが, これらを十分に検討した第三相試験はない。当研究では, RTVとCOBIの臨床上の違いを明らかにするため, RTVからCOBIへの変更時の脂質や腎機能の変化を観察した。

方法: 2017年1月から2017年6月までに当院への通院歴があるHIV患者で, 他の併用薬に変更がなくDRV/RTVからDRV/COBIへとブースターのみを変更した患者を対象として, 変更導入の前後で臨床所見(ウイルス学的効果, 脂質, 腎機能検査値)を比較検討した。

結果: 対象は28例で, 全例が本邦出身者であった。年齢中央値は51歳, 変更の前後でウイルス学的失敗や100copies/mL以上のblipは認めなかった。併用していた抗HIV薬はアバビル/ラミブジン(ABC/3TC)12例, テノホビル/エムトリシタビン(TDF/FTC)6例, ドルテグラビル(DTG)4例, 他の2-drugおよび核酸系逆転写酵素阻害剤(NRTI) sparing regimenが6例であった。変更前後で比較すると, 28例中20例で血清クレアチニン(Cre)が上昇(中央値0.88 vs. 0.94 mg/dL, $p=0.0003$)し, eGFRcreが減少(中央値70 vs. 68 mL/min/1.73 m², $p=0.0002$)していたが, 尿中 β_2 ミクログロブリンやシスタチンCには有意な変化を認めなかった。脂質マーカーの変化は, LDLコレステロール(中央値127 vs. 118 mg/dL, $p=0.72$), HDLコレステロール(47 vs. 48 mg/dL, $p=0.70$), 中性脂肪(166 vs. 165 mg/dL, $p=0.92$)で, 有意な差を認めなかった。統計学的解析はウィルコソンの符号付き順位検定を行った。

結論: COBIはRTVより血清Creを上昇させることが示唆された。また脂質への影響は認められなかった。

キーワード: コビスタット, ダルナビル, リトナビル, 脂質, 腎機能, HIV

日本エイズ学会誌 20: 173-178, 2018

背 景

コビスタット(COBI)はダルナビル(DRV)やアタザナビル(ATV)などのプロテアーゼインヒビターに対し, リトナビル(RTV)と同等のブースター効果を持つとされ^{1,2)}, 第三相試験の結果からはDRV/RTVとDRV/COBIは同等のウイルス学的効果を持つとされている³⁾。しかしながら, COBIとRTVには薬物代謝酵素誘導能⁴⁾やドルテグラビル(DTG)との相互作用などいくつかの臨床上の問題となりえる違いがあることも知られている⁵⁾。

抗HIV療法経験者に対するDRV/COBI使用に関するデータは限られており, 脂質代謝や腎機能への影響にしても不明な点が多い。実臨床で多く経験すると思われるDRV/RTVからDRV/COBIへの切り替えに関しても報告は

著者連絡先: 安達英輔 (〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1 東京大学医科学研究所附属病院感染免疫内科)

2018年3月28日受付; 2018年5月19日受理

本論文の要旨は第31回日本エイズ学会学術集会・総会にて発表された。

少ない⁶⁾。

ブーストされたアタザナビル(boosted ATV)はATV単独使用と比べ中性脂肪(TG)を30mg/dL程度上昇させることなどが知られており⁷⁾, 脂質異常症はRTVの主要な有害反応の1つで, 長年にわたりプロテアーゼインヒビター(PI)をキードラッグとする抗HIV療法の問題点であった。また, COBIは*in vitro*の研究でRTVよりも脂質異常の発症が少なくなることが示唆されていたが⁸⁾, 第三相試験なども含め, 脂質に関する検討は不十分であった。

本邦ではCOBIはエルビテグラビルの合剤として使用されていたが, これまで単独では発売されておらず, 実臨床の場でRTVとCOBIを直接比較することはできなかった。2017年1月から本邦でDRV/COBIが使用可能となり, DRV/RTVからブースターのみを入れ替えるレジメン変更が初めて可能となった。当研究では, RTVとCOBIの臨床上の違いを明らかにするため, 他の併用薬に変更がないHIV感染者で, RTVからCOBIへの変更時の脂質や腎機能検査値などの臨床所見の変化を観察した。

方 法

本研究は2017年1月から2017年6月の間に東京大学医学研究所附属病院（以降、当院）で抗HIV療法施行中のHIV感染者を対象とした後ろ向き観察研究である。90日以上DRV/RTVを含んだ抗HIV療法を行い、他の併用薬に変更がなくDRV/RTVからDRV/COBIへ変更した患者を抽出し、腎機能マーカー（血清クレアチニン（Cre）、シスタチンC、尿中 β_2 ミクログロブリン）と随時採血による脂質マーカー（LDLコレステロール（LDL-C）、HDLコレステロール（HDL-C）、中性脂肪（TG））のいずれかのデータを得ることができたものを対象とし、これらの臨床所見を比較した。患者の基礎データ（年齢、性別、CD4細胞数、HIV-RNA量）は診療録より得た。変更前のベースラインは変更日から直前の検査時のデータ、変更後は変更日から14日以上経過した後の時点から直後の検査データを使用した。これらデータを得た期間で抗HIV薬を含めたなんらかの併用の変更、追加があった患者は除外した。

当研究は単施設研究として、医科学研究所倫理審査委員会の審査と承認を得て行った（承認番号：29-3-A0414）。

・統計学的解析

患者の基礎データは平均値と標準偏差、もしくは中央値と四分位範囲で記載した。定性的なパラメータに関しては百分率（%）を用いた。変更直前と変更直後の腎機能マーカー（血清Cre、シスタチンC、尿中 β_2 ミクログロブリン）と脂質マーカー（LDL-C、HDL-C、TG）（随時採血による）

の解析にはウィルコクソンの符号付き順位検定を用い、 $p < 0.05$ を有意水準とした。

結 果

対象者の選定の段階では国内での発売時期が重なっていたために同時にテノホビルジソプロキシル（TDF）をテノホビルアラフェナミド（TAF）へと変更していた患者が多かったがすべて除外した。図1は2017年1～6月の当研究の実施機関における抗HIV薬の処方状況であり、RTVとCOBIおよびTDFとTAFは区別せずに記載した。期間中に処方されていた抗HIVの薬の中で、boosted DRVはテノホビルやアバカビルをバックボーンとするレジメンで、それぞれ8.7%、8.0%で使われており、テノホビルとアバカビルを含まないレジメンにおいても29例中21例で使われていた。

本研究の対象となった患者のベースライン時の背景を表1に要約する。28例が対象となり、全例が本邦出身者、男性26例、女性2例、年齢中央値は51（28～67）歳であった。ベースライン時に使用していたほかの抗HIV薬はアバカビル/ラミブジン（ABC/3TC）12例、テノホビル/エムトリシタビン（TDF/FTC）6例、ドルテグラビル（DTG）4例、アイセントレス（RAL）2例、DTG/リルピビリン（RPV）1例、RPV 1例、DTG/3TC 1例、MVC（マラビロク）/RPV 1例であった。ベースラインのデータは変更前より中央値21（1～165）日前で、変更後のデータは変更から中央値41（14～110）日後であった。RTVからCOBIへの変更の前後でウイルス学的な失敗や100コピー/mL以上のblipは

図1 実施機関における抗HIV薬の処方状況

表 1 対象者のベースラインのデータ

男性	26 例
女性	2 例
年齢*	51 歳 (28~67)
HIV-RNA 量*	<40 copies/mL (not detected-130)
CD4 数*	499/ μ L (149~1,268)
併用した抗 HIV 薬の組み合わせ	
ABC+3TC	12 例
TDF+FTC	6 例
DTG	4 例
RAL	2 例
DTG/RPV, RPV, DTG/3TC, MVC/RPV	各 1 例
併用されていた脂質異常治療薬	
ロスバスタチン	2 例
オメガ-3 脂肪酸エチル	2 例
エゼチミブ	1 例
併用なし	23 例
血清クレアチニン*	0.88 mg/dL (0.59~1.56)
尿中 β_2 ミクログロブリン*	403 μ g/L (19~4,063)
シスタチン C*	0.82 mg/dL (0.71~1.3)
LDL-C*	128 mg/dL (46~163)
HDL-C*	47 mg/dL (34~91)
TG*	166 mg/dL (40~442)

*中央値 (幅), ABC アバカビル, 3TC ラミブジン, TDF テノホビルジソプロキシル, DTG ドルテグラビル, RAL アイセントレス, RPV リルピピリン, MVC マラビロク, LDL-C LDL コレステロール, HDL-C HDL コレステロール, TG 中性脂肪。

認めなかった。図 2 に腎機能マーカーのベースラインからの変化を示す。28 例中 20 例で血清 Cre が上昇 (中央値 0.88 vs. 0.94 mg/dL, $p=0.0003$) し, eGFR_{cre} が減少 (中央値 70 vs. 68 mL/min/1.73 m³, $p=0.0002$) していた。シスタチン C ($N=13$, 図 2b) や尿中 β_2 ミクログロブリン ($N=18$, 図 2c) は全例では測定されていなかったが, 後方視的に得られたデータではいずれも差は認めなかった。図 3 に脂質マーカーの変化を示す。LDL-C は中央値で 127 mg/dL から 118 mg/dL へ減少していたが, 統計的な有意差は認めなかった ($p=0.72$)。また, HDL-C ($N=28$, 図 3b) や TG ($N=28$, 図 3c) には差を認めなかった。LDL-C のベースライン値が 140 mg/dL 以上であった 6 例 (中央値 154 vs.

図 2 (a) 血清クレアチニン。(b) シスタチン C。
(c) 尿中 β_2 ミクログロブリン。

142 mg/dL, $p=0.31$) やベースラインの TG が 150 mg/dL 以上であった 16 例 (中央値 265 vs. 217 mg/dL, $p=0.127$) に関する解析を行ったが, 変更の前後で統計的な有意な差を認めなかった。28 例中 5 例は脂質異常症治療薬を併用していた (表 1)。

図 3 (a) LDL-C。(b) HDL-C。(c) TG。

考 察

本研究は他の併用薬に変更がなく、RTV と COBI のみを変更した患者を対象とした。したがって、後ろ向き研究ではあるが、臨床所見の変化を薬の変更と関連付けることが可能なデザインとなっている。腎機能マーカーの比較では、血清 Cre の有意な上昇を認めた。RTV および COBI の血清 Cre 上昇機序は、尿細管蛋白質 Multidrug And Toxin

Extrusion (MATE) 1 に対する阻害であると考えられている。MATE 1 に対する IC50 はそれぞれ 1.34, 1.87 μ M とされていたが⁹⁾、本研究の結果から本邦の実臨床の間では COBI がより血清 Cre を上昇させる効果が高いことが明らかとなった。また、図 2b に示すシスタチン C や図 2c に示す尿中 β_2 グロブリンなど他のマーカーに統計的に有意な違いを認めなかった。RTV および COBI 投与時の血清 Cre の上昇は Cre の排泄阻害による見かけ上の腎機能低下であるとするこれまでの考えを支持する結果となり、短期的には真の腎機能の変化がないことが示唆されるが、サンプルサイズによる制限もあり結論づけることは難しい。これまで長期的に RTV と COBI の腎機能への影響を比較した研究はなく、今後の研究が待たれる。

脂質に関しては当研究ではブースターの切り替えに伴う変化はみられなかった。Echeverria らは RTV から COBI へのスイッチに伴い TG および T-Chol, LDL-C が低下したことを報告している⁶⁾。この研究は本研究と同様にブースター以外の併用薬に変更はなく、脂質異常の程度で層別化を行い、中性脂肪やコレステロールが高いほど RTV から COBI への変更のベネフィットが大きかったとしているが、この研究はヨーロッパでの DRV/RTV の PI 単独治療のコホートが対象に含まれていること、変更前のベースラインから 24 週後を比較していることや人種などの対象者の背景が異なっており単純な比較は難しい。また、本研究は長期にわたり RTV を使用している患者を対象とし、COBI への変更直後のデータを比較しているため長期的な変化は評価できておらず、今後の課題である。その他の本研究の限界となる事項としては、脂質の変化は RTV と COBI の脂質代謝への直接の影響のほか、スタチン系薬剤などとの薬物相互作用の違いによる影響も考えられるが、本研究では脂質異常症治療薬の併用が少なく評価できていない。また、シスタチン C や β_2 ミクログロブリンについては一部の症例でデータが得られておらず、データが得られた症例でのデータとなっている。

図 1 は 2017 年 1~6 月の当研究の実施機関における抗 HIV 薬の処方状況であるが、全 513 処方例の中でブースト DRV は全体の約 1 割程度で使用されており、インテグラーゼ阻害剤がガイドライン上で推奨され主流となった今でも一定の割合を占めていることがわかる。DRV は高いジェネティックバリアがあり、アドヒアランス不良患者への切り札としての使用やサルベージ療法として使用例も多いと思われる。現在、服薬の負担、副作用の軽減や医療費の削減を目的とした 2 剤療法の臨床研究および治験が進められているが¹⁰⁾、ここでもブースト DRV は大きな役割を持つ可能性がある。DRV/RTV+3TC の 2 剤療法が、大多数が M184V 等の薬剤耐性変異を持った患者集団に対する

セカンドラインとして高い効果を示すなど^{11,12)}、ブーストDRVを基本とした2剤療法は治療変更患者、未治療患者だけでなくサルベージ療法などさまざまな使用をされる可能性が残されている。海外では後発品によるDRV/RTV合剤が使われている国もあり¹³⁾、COBIとRTVの違いは今後も臨床上の課題になると思われる。COBIはエルビテグラビルのブースターとしても使用され、COBIが腎機能や脂質等にどのような影響を及ぼすのか、さらに長期使用時のRTVとの相違点についても慎重に観察していく必要がある。

利益相反: 本研究において利益相反に相当する事項はない。

文 献

- 1) Crutchley RD, Guduru RC, Cheng AM. Evaluating the role of atazanavir/cobicistat and darunavir/cobicistat fixed-dose combinations for the treatment of HIV-1 infection. *HIV AIDS (Auckl)* 8 : 47-65, 2016.
- 2) Kakuda TN, Opsomer M, Timmers M, Iterbeke K, Van de Castele T, Hillewaert V, Petrovic R, Hoetelmans RM : Pharmacokinetics of darunavir in fixed-dose combination with cobicistat compared with coadministration of darunavir and ritonavir as single agents in healthy volunteers. *J Clin Pharmacol* 54 : 949-957, 2014.
- 3) Tashima K, Crofoot G, Tomaka FL, Kakuda TN, Brochot A, Van de Castele T, Opsomer M, Garne W, Margot N, Custodio JM, Fordyce MW, Szwarcberg J : Cobicistat-boostered darunavir in HIV-1-infected adults: week 48 results of a Phase IIIb, open-label single-arm trial. *AIDS Res Ther* 11 : 39, 2014.
- 4) Song I, Min SS, Borland J, Lou Y, Chen S, Patel P, Ishibashi T, Piscitelli SC : The effect of lopinavir/ritonavir and darunavir/ritonavir on the HIV integrase inhibitor S/GSK1349572 in healthy participants. *J Clin Pharmacol* 51 : 237-242, 2011.
- 5) Gervasoni C, Riva A, Capetti A, Cozzi V, Rizzardini G, Galli M, Clementi E, Cattaneo D : Increased dolutegravir exposure in HIV patients switched from ritonavir to cobicistat. *Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Seattle, 2017.*
- 6) Echeverria P, Bonjoch A, Puig J, Ornella A, Clotet B, Negredo E : Significant improvement in triglyceride levels after switching from ritonavir to cobicistat in suppressed HIV-1-infected subjects with dyslipidaemia. *HIV Med* 18 : 782-786, 2017.
- 7) Tomaka F, Lefebvre E, Sekar V, Van Baelen B, Vangeneugden T, Vandevorode A, Diego Miralles G : Effects of ritonavir-boostered darunavir vs. ritonavir-boostered atazanavir on lipid and glucose parameters in HIV-negative, healthy volunteers. *HIV Med* 10 : 318-327, 2009.
- 8) Putcharoen O, Do T, Avihingsanon A, Ruxrungtham K : Rationale and clinical utility of the darunavir-cobicistat combination in the treatment of HIV/AIDS. *Drug Des Devel Ther* 9 : 5763-5769, 2015.
- 9) El Lepist BM, Tong L : Cobicistat matches ritonavir as booster, studies clarify effects on kidney function. *Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, 2011.*
- 10) Llibre JM, Hung CC, Brinson C, Castelli F, Girard PM, Kahl LP, Blair EA, Angelis K, Wynne B, Vandermeulen K, Underwood M, Smith K, Gartland, M, Aboud M : Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1 : phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies. *Lancet* 391 : 839-849, 2018.
- 11) Ciaffi L, Koulla-Shiro S, Sawadogo AB, Ndour CT, Eymard-Duvernay S, Mbouyap PR, Ayangma L, Zoungrana J, Gueye NFN, Diallo M, Izard S, Bado G, Kane CT, Aghokeng AF, Peeters M, Girard PM, Le Moing V, Reynes, J, Delaporte E : Boosted protease inhibitor monotherapy versus boosted protease inhibitor plus lamivudine dual therapy as second-line maintenance treatment for HIV-1-infected patients in sub-Saharan Africa (ANRS12 286/MOBIDIP) : a multicentre, randomised, parallel, open-label, superiority trial. *Lancet HIV* : 4e384-e92, 2017.
- 12) Gagliardini R, Ciccullo A, Borghetti A, Maggiolo F, Bartolozzi D, Borghi V, Pecorari M, Di Biagio A, Paola Callegaro A, Bruzzone B, Saladini F, Paolucci S, Bellazzi L, Di Giambenedetto S, De Luca A : Impact of previous M184V on virological outcome of switch to 3TC-based dual therapies. *Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Boston, 2018.*
- 13) Figueroa MI, Sued OG, Gun AM, Belloso WH, Cecchini DM, Lopardo G, Pryluka D, Rolon MJ, Fink VI, Lloret SP, Cahn P : DRV/R/3TC for HIV-1 treatment-naïve patients : week 48 results of the Andes study. *Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Boston, 2018.*

Clinical Laboratory Findings in the Patients Switching from DRV/RTV to DRV/COBI

Eisuke ADACHI¹⁾, Hidenori SATO¹⁾, Tadashi KIKUCHI¹⁾, Michiko KOGA¹⁾,
Takeya TSUTSUMI¹⁾, Tomohiko KOIBUCHI¹⁾ and Hiroshi YOTSUYANAGI¹⁾

¹⁾ IMSUT Hospital, the Institute of Medical Science, the University of Tokyo,
Division of Infectious Diseases and Applied Immunology

Background : Fixed dose combination of darunavir/cobicistat (DRV/COBI) was released in Japan in January, 2017 and switching from ritonavir (RTV) to COBI without changes of other concomitant drugs became possible. Phase III trials have demonstrated that the efficacy and safety of COBI are comparable to those of RTV, but these studies have not properly addressed the renal function and the lipid profile. The objective of this study is to evaluate changes in lipid parameters and renal function in virologically suppressed HIV-infected patients who were receiving DRV/RTV and switched from RTV to COBI.

Methods : HIV-infected patients that presented to our hospital from January 2017 to June 2017 and switched from DRV/RTV to fixed dose drug of DRV/COBI were included, and the information was obtained from medical records. Serum creatinine, urine β_2 -microglobulin, cystatin C, lipid parameters, state of HIV infection and outcome were analyzed.

Results : Twenty-eight HIV-infected patients were eligible. Virological failures or blips more than 100 copies/mL were not observed before and after the switch from RTV to COBI. The concomitant antiretroviral drugs are 12 abacavir/lamivudine, 6 tenofovir/emtricitabine, 4 dolutegravir. Changes in serum creatinine level were statistically significant from median 0.88 mg/dL at baseline to 0.94 mg/dL after the switch ($p=0.0003$). No statistically differences were seen in cystatin C, urine β_2 -microglobulin. Changes from baseline in LDL cholesterol (median 127 mg/dL vs. 118 mg/dL, $p=0.72$), HDL cholesterol (median 47 mg/dL vs. 48 mg/dL, $p=0.70$) and Triglyceride (median 166 mg/dL vs. 165 mg/dL, $p=0.92$) were not statistically significant.

Conclusion : Fixed dose combinations of DRV/COBI increased serum creatinine level compared with DRV/RTV and the switch from RTV to COBI had a no substantial effect on the lipid profile in patients with HIV.

Key words : fixed dose combinations of darunavir/cobicistat, ritonavir, lipid profile, renal function, HIV